

Portulacaria Afra نام علمی گیاهی است در خانواده ی ساکولنتها و بومی قاره ی آفریقا که اقبال خاصی در میان علاقمندان به بونسای دارد . نام دیگر این گیاه جید می باشد . و در ایران هم با نام های عامیانه ی پرپنی و کراسولای خرفه ای نامیده می شود . در متن زیر مزایا و معایب و تا حدودی نحوه ی نگهداری و رفتار با این گیاه شرح داده شده است . از مخاطبان خواهشمندیم در صورتی که احساس می کنند مطلبی در این خصوص نادیده و نانوشته مانده ، از تماس با ما در جهت تکمیل این نوشتار، مضایقه ننمایند .

مزایا

گیاهی مقاوم در برابر کم آبی ، دمای محیطی بالا و هرس ریشه که زیبا و دوست داشتنی ، با برگهای کوچک و گوشتی است ؛ هرس پذیری خوبی دارد و در صورت مهیا کردن شرایط نگهداری ، عمری طولانی خواهد داشت . این گیاه سرعت رشد خوبی دارد و به زودی ظاهری پیر و کهنسال به خود می گیرد . آفتاب دوست است و نکته ی جالب این است که در صورت ماندن طولانی مدت در آفتاب ، برگها دچار سوختگی نخواهند شد و قابلیت فرمدهی در اکثر فرمها را دارد . از دیگر مزایای این گیاه این است که به علت مقاومت و راحتی نگهداری ، برای افراد مبتدی در بونسای ، گونه ی مناسبی

است و تمام این خصایص باعث خواهد شد که گزینه ی مناسبی هم برای تولید تجاری بونسای باشد .

معایب

عدم امکان استفاده از تکنیک های زیبای جین و شاری در این گونه کمی حسرتبار به نظر می رسد و در صورت نگهداری در داخل به بیماریهای قارچی حساس می باشد ، سیم بندی روی این گونه به علت ترد و شکننده بودن و چوبی نبودن اندام گیاه ، کمی سخت است و به علت اینکه خصوصیات درخت های چوبی را ندارد شاید در نظر بیننده حس درخت بودن و دوام و پایداری را به خوبی سایر درختها تداعی نکند و از همین روست که مخالفان متعصبی هم در وادی بونسای دارد که وقت و انرژی گزاردن برای این گونه را کاری عبث می پندارند .

نیازها و نحوه ی نگهداری و پرورش

از آنجایی که ریشه های مویی مناسب گلدان تخت دارد و در مقدار کمی خاک زنده می ماند نیاز به خاکی بازهکشی سریع دارد (آبیاری را با این خاک بایستی تنظیم کرد) و بین آبیاری ها حتما خاک خشک شود .

این گیاه ریشه پر بودن را ترجیح می دهد و حتی سالها نیاز به هرس ریشه ندارد ولی اگر هرس ریشه ی سنگین هم بر روی آن اعمال گردد برای گیاه خطرناک نیست .

قبل از تعویض گلدان و هرس ریشه باید خاک خشک شود و بعد از تعویض خاک هم فوری آبیاری نشود .

گیاهی است با واکنش خوب نسبت به تغذیه سنگین ؛ بسته به نوع خاک در فصل رشد با کود بالانس و هر هفته تغذیه شود و در فصل رکود نیز ماهیانه .

مواد شیمیایی که بر پایه ی نفت هستند را هیچگاه نباید بر روی ساکولنتها امتحان کرد چرا که باعث ریزش برگها و ازبین رفتن گیاه می گردد .

در صورت پوسیدگی ریشه در اثر آبیاری زیاد ، باید خاک خشک شده و ۲ هفته کامل به همان حالت بماند حتی شاید نیاز به تعویض خاک باشد که با خاک دانه بندی درشت تر جایگزین شود .

در ابتدای رویش این گیاه، ریشه ها پایداری خوبی ندارند ، می توان گیاه را به یک سنگ یا چوب تا زمان استحکام ریشه ، تکیه داد .

پورتولاکاریا گیاهی گرمسیری است پس باید از انجماد محافظت شود و حتی به عنوان گیاه داخلی به شرط نوردهی زیاد قابل نگهداری است .

❁ هیچگاه جین و شاری بر روی این گونه نباید امتحان شود چرا که باعث پوسیدگی و مرگ گیاه خواهد شد .

❁ این گونه برای هرس نیازی به مقعر بُر ندارد و برش مستقیم حتی برای شاخه های ضخیم جهت هرس آن کافی است ؛ به عنوان احتیاط می توان یک بند یا نیم بند اضافی را در حین هرس نگه داشت ، جوانه زنی گیاه هم به این صورت است که از بند قبل ، دو جوانه ی روبروی هم ظاهر می شود .

❁ این گیاه مستعد ریشه زایی است و به راحتی با قلمه و بدون نیاز به هیچ هورمونی ، تکثیر می شود حتی شاخه و تنه های ضخیم و حتی در مواردی برگ گیاه .

❁ قبل از کاشت قلمه ، دو روز در سایه نگهداری شده تا محل برش بسته شود و سپس در خاک خشک و بازهکشی بالا کاشته شود .

❁ بر خلاف نوشته های گذشته ، سیم بندی بر روی این گیاه به خوبی و با کمی دقت بیشتر، موفقیت آمیز است ؛ فقط باید مراقب بود که در مدت طولانی ، اثر زخم سیم بر روی شاخه ایجاد نشده و با تداوم سیم بندی اثری بر روی شاخه باقی نماند و البته فرم گیری خوب این گیاه به تنهایی با هرس هم از مزایای آن می باشد .

منابع :

این متن با همت ، همکاری و نظرات دوستان مشروح ذیل تدوین و منتشر گردید:

خانم سیما کلباسی ، آقای مجید حاج محمدی ، آقای پیام ایوانی ، آقای مهدی براری ، آقای بهروز ریوندی ،
آقای امیر محمد نجف پور ، آقای مجتبی شیرغلامی ، آقای مسعود عظیمی ، آقای شاهرخ رحیمی

سایت : <https://www.bonsaimary.com>





یکی از اساتید بونسای آمریکاست که فعالیت خوبی بر روی این گونه James J. Smith آقای

(portulacaria afra)

آنها از یک قلمه که توسط james داشته است . این درخت بیش از ۶۰ سال در حال پرورش است شخصی از آفریقا فرستاده شده ، رشد داده است . در طول آن دهه ها شاید بالغ بر ۱۵۰ بار هرس شده است . حدود ۱۲ بار هرس ریشه و حداقل چهار بار طراحی مجدد